Jurnal

ENTROPI

Inovasi Penelitian, Pendidikan dan Pembelajaran Sains

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Kimia
Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo

VOLUME
IX

NOMOR
2

HALAMAN
841 - 960

AGUSTUS
2014

ISSN
1907-1965

Jurnal
ENTROPI

Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Sains

Sekretariat Penyuntingan dan Tata Usaha

Jurusan Pendidikan Kimia - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Unviversitas Negeri Gorontalo

Gedung N, Lantai 1

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, 96128

Email: jurnal-entropi@ung.ac.id dan jurnal-entropi@gmail.com

JE

ISSN 1907 -1965

Jurnal Entropi

Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Sains

Volume 9, Nomor 2, Agustus 2014

Jurnal Entropi (JE) terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan Februari dan Agustus, berisi tulisan, artikel, hasil pemikiran dan penelitian yang ditulis oleh para pakar, ilmuwan, praktisi dan pengkaji inovasi penelitian pendidikan dan pembelajaran sains.

Ketua Penyunting

Lukman A. R. Laliyo

Penyunting Pelaksana

Mardjan Paputungan

Mangara Sihalo

Erni Mohamad

JulhimTangio

Rakhmawaty Ahmad Asui

Suleman Duengo

Hendri Iyabu

La Ode Aman

La Alio

Deasy Natalia Botutihe

Penyunting Ahli

Evie Hulukati

Weni J. A. Musa

Ishak Isa

Astin Lukum

Opir Rumape

Nurhayati Bialangi

Netty Ino Ischak

Yuszda Salimi

Akram La Kilo

Pelaksana Tata Usaha

Erni Isa

Fatmawati

Jurnal Entropi (JE) diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Gorontalo (UNG). **Dekan:** Evie Hulukati; **Ketua Jurusan:** Drs. Mardjan Paputungan, M.Si. Terbit pertama kali pada tahun 2006 dan konsisten mempublikasikan karya ilmiah dosen dan praktisi di Gorontalo dan sekitarnya. Upaya memperbaiki kualitas, bahasa dan tampilan terus dilakukan; hingga memenuhi standar kelayakan jurnal terakreditasi.

Pertanggungjawaban Isi Artikel

Naskah/artikel yang disumbangkan kepada JE harus memenuhi aturan dalam "Petunjuk bagi (Calon) Penulis Jurnal Entropi (JE) di sampul belakang, halaman bagian dalam. Isi artikel dan semua akibat yang ditimbulkan oleh artikel itu menjadi tanggungjawab mutlak penulisnya. JE juga melayani permintaan tukar menukar jurnal secara gratis sepanjang tirus masih tersedia.

Jurnal Entropi (JE) diterbitkan dengan tirus (*oplaag*) 350 (tiga ratus lima puluh) eksemplar.

DAFTAR ISI

- 1 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kimia Dengan Menginterkoneksi Multipel Representasi Untuk Mereduksi Miskonsepsi Siswa 841-846
Masrid Pikoli, Mangara Sihaloho
Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo
- 2 Misteri Gagalnya Chaos: Barisan Hingga Bifurkasi Period-Doubling Pada Sistem Interaksi Nonlinear Sepasang Osilator 852-857
Hasan S. Panigoro
Jurusan Matematika Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo
- 3 Pemanfaatan Limbah Aluminium Foil Sebagai Bahan Keagulan Poli Aluminium Klorida (PAC) Pada Pengolahan Air Buangan Laboratorium 859-864
Erni Mohamad
Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo
- 4 Identifikasi Kesalahan Siswa dalam Memahami Konsep Reaksi Reduksi Oksidasi di SMA Negeri 1 Suwawa 867-872
Hardis, Mardjan Papatungan, Mangara Sihaloho
Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo
- 5 Pengembangan Perangkat Pembelajaran *Integrative Science* Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA 875-880
Abdul Haris Odja
Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Gorontalo
- 6 Penentuan Harga Opsi Asia Dengan Model Binomial Yang Dimodifikasi 881-886
Emli Rahmi
Jurusan Matematika FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo
- 7 Model Hubungan Faktor Penyebab Keluhan Fisik Gangguan Otot Dan Sendi Pada Operator Komputer 889-894
Asep Suryana Abdurrahmat
Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Gorontalo
- 8 Pembuatan Reagen Alternatif COD-Reaktor untuk Efisien Manajemen Laboratorium 904-909
Wiwin Rewini Kunusa, Rina H.Gani, Yusnar Lebie, Roman Hippy
Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo

841-	9	Potensi Tanaman Mahoni (<i>Swietenia Mahagoni (L.) Jacq</i>) Sebagai Fitoremediasi Logam Timbal (Pb) Wiwin Lahila, Mangara Sihaloho dan Rakhmawaty Ahmad Asui Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo	904-914
852-	10	Pembuatan Adsorben Selulosa dari Serat Daun Nanas (<i>Ananas Comosus</i>) Malfit Damopolii, Astin Lukum, Mardjan Paputungan Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo	915-921
859-	11	Kemampuan Tumbuhan Genjer (<i>Limnocharis Flava</i>) Dalam Mengakumulasi Logam Berat Cu Zainudin Simon, Ishak Isa, Weny J.A Musa Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo	922-929
867-	12	Studi Kemampuan Kognitif dan Afektif Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Telaga dalam Pembelajaran Kimia Menggunakan Model Pembelajaran <i>Problem Based Solving Learning</i> (PBSL) Rahman Dunggjo, Astin Lukum, Julhim S. Tangio. Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo	930-936
875-	13	Implementasi Pendekatan Ilmiah Berbasis Masalah Dalam Pembelajaran Matematika Sumarno Ismail Jurusan Matematika FMIPA Univeritas Negeri Gorontalo	937-948
881-	14	Pengaruh Konsentrasi Air Kelapa Muda Terhadap Pertumbuhan <i>Saccharomyces cereviceae</i> Dian Saraswati Jurusan Kesehatan Masyarakat, FIKK Universitas Negeri Gorontalo	949-956
889-	15	Uji Aktivitas <i>Repellent</i> Nyamuk dari Ekstrak Daun Jeringau (<i>A. calamus L.</i>) Susanti Abdullah, Nurhayati Bialangi, Suleman Duengo Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Gorontalo	957-960

Kemampuan Tumbuhan Genjer (*Limnocharis Flava*) Dalam Mengakumulasi Logam Berat Cu

Zainudin Simon, Ishak Isa, Weny J.A Musa

Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi: Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kemampuan tumbuhan genjer dalam mengakumulasi logam berat setelah diberi kontaminan logam Cu. Kemudian melihat konsentrasi logam Cu yang diabsorpsi tumbuhan dan terakhir melihat bagaimana pengaruh variasi waktu tinggal 10, 15, 20, 25 dan 30 hari dengan konsentrasi 15 ppm terhadap absorpsi Cu oleh tumbuhan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola Faktorial. Faktor pertama adalah konsentrasi Cu^{2+} 15 ppm dan faktor ke dua adalah variasi waktu tinggal. Setiap variasi waktu tinggal mempunyai tiga kali ulangan. Tumbuhan ditanam dalam polybag dan diaklimatisasi selama 2 minggu. Penelitian dilakukan dengan menambahkan larutan Cu 15 ppm pada media tanam genjer, tumbuhan dibiarkan hidup pada variasi waktu yang ditentukan. Analisis logam berat Cu dilakukan menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan pada perlakuan hari ke-10 sampai hari ke-30 tumbuhan mampu mengabsorpsi logam Cu masing-masing sebesar 8,417, 7,166, 5,195, 4,542 dan 5,657 ppm. Absorpsi Cu oleh tumbuhan ini meningkat jika dibandingkan dengan konsentrasi Cu pada tumbuhan genjer yang dijadikan kontrol (1,369 ppm). Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan genjer mampu menyerap dan mengakumulasi logam berat Cu di dalam tanah tercemar Cu. Dari hasil uji statistik menggunakan RAL ($\alpha=5\%$) diperoleh F hitung 8,06 > F tabel 3,48. Hal ini menunjukkan bahwa waktu tinggal memiliki pengaruh nyata terhadap Cu^{2+} yang terabsorpsi pada tumbuhan genjer.

Kata kunci: Fitoremediasi, Genjer (*Limnocharis flava*), Logam Cu, SSA.

Meningkatnya aktivitas manusia baik dalam kegiatan pertanian, industri, pertambangan dan lain-lain telah menyebabkan berbagai dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami.

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya (Nurhayati, N. 2013:59).

Salah satu bahan kimia yang dapat mencemari tanah adalah logam berat. Logam berat umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup, walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Tembaga/*Cuprum* (Cu) merupakan salah satu logam berat yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran pada tanah dan memberikan pengaruh buruk pada organisme. Logam Cu berpotensi toksik terhadap tanaman dan berbahaya bagi manusia karena bersifat karsinogenik". (dalam Hardiani, 2009).

Agar pencemaran tanah yang disebabkan oleh logam berat Cu tidak terjadi, upaya pemulihan perlu dilakukan agar tanah yang tercemar dapat digunakan kembali dengan aman. Salah satu metode yang aplikatif dan diharapkan mampu menangani masalah

pencemaran logam berat pada tanah adalah dengan cara fitoremediasi.

Menurut Subroto (dalam Hardyanti, 2007) bahwa: "Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan baik secara *ex-situ* menggunakan kolam buatan atau reaktor maupun *in-situ* (langsung di lapangan) pada tanah atau daerah yang terkontaminasi limbah".

Bahan dan Metode

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah AAS, alat gelas, pipet ukur, neraca analitik, spatula, kaca arloji, batang pengaduk, penangas air, alat gerus, cawan penguapan.

Bahan yang digunakan adalah tumbuhan genjer (*Limnocharis flava*) 30 pohon, tanah asli tempat tumbuhnya genjer, tanah kompos, aquadest, HNO₃ (asam nitrat), CuSO₄.5H₂O.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Dimana Faktor pertama adalah konsentrasi Cu²⁺ 15 ppm pada tanah, faktor kedua adalah lamanya kontak (t) selama 30 hari dengan pengukuran 5 taraf yaitu hari ke-10, 15, 20, 25 dan hari ke-30. Setiap variasi waktu mempunyai tiga perlakuan.

Uji Pendahuluan Kandungan Cu dalam Sampel Sebelum Perlakuan

Uji Pendahuluan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif pada tumbuhan genjer sebelum di tambahkan limbah buatan, Preparasi sampel dapat dilakukan dengan cara (dalam Haruna, 2012) : Tumbuhan genjer yang tidak diberi perlakuan dicuci bersih dengan aquades. Dibungkus dengan aluminium foil dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 60°C selama 24 jam. Sampel yang sudah digerus diletakkan dalam cawan penguapan dan dimasukan dalam furnace pada suhu 500°C selama ± 8 jam sampai menjadi abu yang berwarna putih. Kemudian diambil 1 gram sampel ditambahkan 10 ml asam nitrat pekat HNO₃ 65%, dipanaskan di atas penangas air pada suhu 100-120°C sampai buih habis, HNO₃ hampir kering (seperti bubuk) dan bening, setelah itu hasil destruksi ditambahkan

sedikit aquades dan HNO₃, dimasukan ke labu ukur 25 ml dan diencerkan dengan aquadest sampai tanda batas. Larutan sampel yang diperoleh siap diuji dengan menggunakan SSA. Perlakuan yang sama dilakukan untuk sampel tanah.

Penentuan Cu²⁺ dalam tumbuhan genjer sebelum dan setelah perlakuan SSA

Penentuan Cu²⁺ setelah perlakuan dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer AAS. Tumbuhan genjer dari masing-masing perlakuan diambil pada hari ke-10, 15, 20, 25 dan 30. Preparasi sampel dilakukan sama dengan penentuan sebelum perlakuan. Hasil destruksi yang telah ditambahkan dengan aquadest dan HNO₃, Selanjutnya dimasukan ke dalam labu ukur 25 ml dan ditambahkan dengan aquades sampai tanda batas. Larutan sampel ini diuji dengan menggunakan SSA,

Pembuatan Larutan Baku Induk Cu²⁺ 1000 mg/L

Serbuk CuSO₄.5H₂O standar ditimbang sebanyak 0,96 gram, dimasukan dalam gelas kimia, ditambahkan 5 ml HNO₃ pekat, dimasukan ke dalam labu ukur 250 ml dan diencerkan dengan aquades sampai tanda batas sehingga konsentrasi menjadi 1000 mg/L.

Pembuatan Larutan Baku Kerja Cu²⁺ 15 mg/L

15 ml larutan baku induk dipipet, kemudian dimasukan ke dalam labu ukur 100 ml, diencerkan dengan aquades sampai tanda batas sehingga konsentrasi menjadi 15 ppm. Larutan yang diperoleh merupakan Larutan Cu²⁺ 15 mg/L. Larutan baku kerja ini dibuat sebanyak ±7,5 liter untuk keperluan pada saat proses penyiraman tanaman.

Pembuatan Larutan Standar Cu²⁺

Membuat larutan standar dari larutan baku induk Cu²⁺ 1000 ppm dengan masing-masing dipipet 0.025, 0.075, 0.125, 0.175, 0.225 ml, selanjutnya diencerkan dengan aquades sampai 25 mL menggunakan labu ukur. Dari variasi volume tersebut diperoleh larutan standar Cu²⁺ 1 ppm, 5 ppm, 7 ppm, dan 9 ppm. Larutan standar tersebut diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA)

pada panjang serapan yang kalibrasi.

Analisis Data

Penelitian menggunakan persamaan diperoleh Cu²⁺ pada sampel.

Menentukan

Penelitian dilakukan dengan garis linier, sampel dan konsentrasi sebenarnya dengan perbandingan Ketut, 2012

M =
Keterangan
M = Kandungan
C = Konsentrasi
(µg/ml)
V = Volume
F = Faktor
B = Bobot

Analisa

Data menggunakan Untuk men dilakukan (Mohamad

1.) Faktor

$$FK = \frac{\sum_{i=1}^p}{\sum_{i=1}^p}$$

2.) Jumlah

(Yitnosuma

Jumlah Kuadrat

$$JK_{total} = \sum_{i=1}^n$$

Jumlah Kuadrat

$$JK_{perlakuan} =$$

Jumlah Kuadrat

pada panjang gelombang 324,7 nm kemudian serapan yang diperoleh diplot ke dalam kurva kalibrasi.

Analisis Data

Penentuan konsentrasi dilakukan dengan menggunakan Persamaan Regresi Linier $y = bx + a$. Persamaan regresi linear dari larutan baku yang diperoleh digunakan pada penentuan konsentrasi Cu^{2+} pada sampel.

Menentukan Kandungan Cu Dalam Sampel

Penentuan kandungan Cu pada sampel dilakukan dengan teknik kurva kalibrasi yang berupa garis linier, sehingga dapat ditentukan konsentrasi sampel dari absorbansi yang terukur. Setelah konsentrasi pengukuran diketahui maka kandungan sebenarnya dalam sampel kering dapat ditentukan dengan perhitungan (Siaka., dkk dalam Antari dan Ketut, 2012):

$$M = \frac{C \cdot V \cdot F}{B}$$

Keterangan :

M = Kandungan Cu dalam sampel ($\mu\text{g}/\text{gr}$)

C = Konsentrasi yang diperoleh dari kurva kalibrasi ($\mu\text{g}/\text{ml}$)

V = Volume larutan sampel (ml)

F = Faktor pengenceran

B = Bobot sampel (gr)

Analisa statistik

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Untuk mengetahui pengaruh dari tiap perlakuan dilakukan dengan uji F pada taraf nyata 5% (Mohamad., E, 2011:36).

1.) Faktor Koreksi (FK) (Yitnosumarto, 1993:20) :

$$FK = \frac{(\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n Y_{ij})^2}{pn}$$

2.) Jumlah-jumlah kuadrat yang diperlukan (Yitnosumarto, 1993:21) :

Jumlah Kuadrat Total (JKT)

$$JK_{\text{total}} = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n Y_{ij}^2 - FK$$

Jumlah Kuadrat Perlakuan

$$JK_{\text{perlakuan}} = \frac{(\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n Y_{ij})^2}{n} - FK$$

Jumlah Kuadrat Galat Percobaan ($JK_{G.\text{perc.}}$)

$$JK_{G.\text{perc.}} = JK_{\text{total}} - JK_{\text{perlakuan}}$$

3.) Kuadrat Total Setiap Sumber Keragaman (Yitnosumarto, 1993:21) :

$$KT_{\text{perlakuan}} = JK_{\text{perlakuan}} / db_{\text{perlakuan}}$$

$$KT_{G.\text{perc.}} = JK_{G.\text{perc.}} / db_{G.\text{perc.}}$$

4.) Uji F (Yitnosumarto, 1993:22) :

$$F_{\text{hitung}} = KT_{\text{perlakuan}} / KT_{G.\text{perc.}}$$

$$BNT(\alpha) = t_{\text{table}}^{\alpha/2} \times (v) \sqrt{\frac{2 \times KT_{G.\text{perc.}}}{n}}$$

Hasil Dan Pembahasan

Pembuatan larutan standar bertujuan sebagai standar untuk analisis kandungan tertentu dalam suatu sampel. Dalam keperluan analisis logam Cu diperlukan deret larutan standar logam Cu^{2+} dengan variasi konsentrasi 1,00, 3,00, 5,00, 7,00 dan 9,00 ppm. Selanjutnya diukur absorbansinya sehingga diperoleh kon larutan standar Cu seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data hasil penyerapan larutan standar Cu

No.	Abs	Kons[ppm]
1	0,000	0,000
2.	0,154	1,000
3.	0,340	3,000
4.	0,536	5,000
5.	0,706	7,000
6.	0,995	9,000

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat diperoleh kurva kalibrasi dengan persamaan garis regresi linier $y = 0.1047x + 0.0187$. dimana y = absorbansi dan x = konsentrasi kandungan Cu. nilai korelasi antara absorbansi dan konsentrasi sebesar $r = 0,993$. kurva kalibrasi larutan standar Cu dapat dilihat pada Gambar 2

Gambar 2. Kurva kalibrasi larutan standar Analisis Logam Berat Cu Pada Genjer

Pengukuran konsentrasi logam Cu pada sampel tanah dan genjer sebelum perlakuan, diperoleh data seperti pada Tabel 2. Data analisis logam Cu terhadap masing-masing sampel yang sudah dikontaminasikan dengan larutan Cu^{2+} 15 ppm dapat disajikan dalam Tabel 3. Sedangkan nilai kandungan logam Cu sebenarnya dalam sampel kering yang sudah diberi zat kontaminan diperoleh data seperti pada Tabel 4

Tabel 2. Data hasil penyerapan Cu (kontrol)

No.	Sampel	Abs	Kons. [ppm]
1.	Tanah	0.097	0.748
2.	Genjer	0.162	1.369

Tabel 3. Data konsentrasi Cu yang terabsorpsi oleh tanaman Genjer

Kons (ppm)	Waktu (t)	[Cu] terabsorpsi (ppm)			
		Ulangan			
		1	2	3	Rerata
15 ppm	t1	9,191	8,599	7,462	8,417
	t2	8,589	7,166	5,743	7,166
	t3	5,113	4,836	5,638	5,195
	t4	4,616	4,788	4,224	4,542
	t5	4,893	4,979	7,099	5,657

Tabel 4. Data kandungan Cu dalam sampel kering

Waktu (t)	Kandungan Cu ($\mu\text{g}/\text{gr}$)			Rerata kandungan Cu ($\mu\text{g}/\text{gr}$)
	Ulangan			
	1	2	3	
10	459,5	429,9	373,1	420,8
15	429,4	358,3	287,1	358,3
20	255,6	241,8	281,9	259,7
25	244,6	239,4	211,2	227,1
30	244,6	248,9	354,9	282,8

Kemampuan Tumbuhan Genjer Dalam Mengakumulasi Logam Cu^{2+}

Genjer (*Limnocharis flava*) merupakan tumbuhan yang sudah beradaptasi baik dengan iklim Indonesia, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai agen fitoremediator

karena dapat menyerap dan mengakumulasi logam Cu pada tanah tercemar.

Dari data Tabel 2, teramati setelah pendahuluan menggunakan SSA, hasil tumbuhan genjer sebagai kontrol atau yang tidak diberikan perlakuan mengandung logam tembaga sebanyak 1,369 ppm. hal ini teramati mengundangi reaksi pertanyaan karena sebelumnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI-2, 2004) (dalam Widaningrum, 2007) menyatakan bahwa logam berat yang memenuhi standar BMR (Batas Maksimum Residu dalam tanaman adalah 1,0 ppm. Terkandungnya tembaga secara berlebihan pada genjer tersebut diduga disebabkan oleh pemupukan yang berlebihan, pemakaian insektisida dan air irigasi yang tercemar limbah (Munarso dkk., 2005 dalam Widaningrum, 2007). Pencemaran logam berat tembaga terjadi selama proses pra panen yang selama penanaman dan pemeliharaan, yang disebabkan pemakaian pupuk mikro yang mengandung tembaga.

Besarnya jumlah Cu pada genjer yang dijadikan kontrol atau standar ini tidak akan mempengaruhi jumlah kandungan logam yang diakumulasi tumbuhan genjer akibat diberikannya perlakuan dengan zat kontaminan Cu sebesar 15 ppm.

Selanjutnya dari data Tabel 3, menyatakan bahwa ketika dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom dengan panjang absorbansi yang bervariasi, tumbuhan genjer yang sudah diberi larutan Cu^{2+} 15 ppm dapat mengabsorpsi logam Cu dengan baik. Pada perlakuan hari ke-10 sampai hari ke-30 tumbuhan mampu mengabsorpsi logam Cu dengan konsentrasi masing-masing sebesar 8,417, 7,166, 5,195, 4,542 dan 5,657 ppm. Absorpsi Cu oleh tumbuhan ini ternyata meningkat jika dibandingkan dengan konsentrasi Cu genjer yang dijadikan sebagai kontrol pada Tabel 2 (1,369 ppm). Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan genjer mampu menyerap dan mengakumulasi logam berat Cu di dalam tanah tercemar Cu.

Sedangkan sebenarnya data pada tabel 4 menunjukkan jumlah kandungan Cu sampai hari ke-30 adalah $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$, $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$, $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$, $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$, $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$. Keragaman variasi waktu tumbuhan genjer yang $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$ telah mampu menyerap dan terutama Cu genjer sebesar kisarannya $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$ Indonesia, (2007:22) 03725/B/SK. Cemaran Logam Segar, batas $259,7 \mu\text{g}/\text{gr}$. Maka genjer yang media temp dikonsumsi bahan per sebagai akumulasi khususnya

Kemampuan dalam menyerap pada Gambar

Gambar 3.

Sedangkan untuk nilai kandungan Cu sebenarnya dalam tumbuhan genjer tampak seperti pada tabel 4. Dari tabel tersebut dapat diamati jumlah kandungan logam Cu dari hari ke-10 sampai hari ke-30 memiliki keragaman seperti halnya konsentrasi yang didapatkan pada tabel 4.2, nilai kandungan Cu dalam sampel kering pada hari ke-10 sampai hari ke-30 masing-masing 420,8 $\mu\text{g}/\text{gr}$, 358,3 $\mu\text{g}/\text{gr}$, 259,7 $\mu\text{g}/\text{gr}$, 227,1 $\mu\text{g}/\text{gr}$ dan 282,8 $\mu\text{g}/\text{gr}$. Keragaman kandungan Cu yang diperoleh dari variasi waktu yang dipilih jika dibandingkan dengan genjer yang sebelumnya tidak diberi perlakuan (68,4 $\mu\text{g}/\text{gr}$) telah membuktikan bahwa tanaman genjer ini mampu dengan baik mengabsorpsi logam berat terutama Cu. Hal ini didasari dengan selisih antara genjer sebelum dan sesudah perlakuan yang kisarannya mencapai 352,4 $\mu\text{g}/\text{gr}$. Mengingat di Indonesia, Ditjen POM (dalam Widaningrum, 2007:22) telah mengeluarkan Keputusan No. 03725/B/SK/VII/89 tentang Batas Maksimum Cemar Logam dalam Makanan untuk Sayuran Segar, batas aman untuk Pb 2 $\mu\text{g}/\text{gr}$ dan Cu 50 $\mu\text{g}/\text{gr}$. Maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan genjer yang telah diberikan zat kontaminan pada media tempat tumbuhnya ini tidak aman untuk dikonsumsi akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait pemanfaatan genjer sebagai akumulator yang baik bagi logam berat khususnya Cu.

Kemampuan atau daya serap tumbuhan ini dalam mengakumulasi logam berat Cu dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

Gambar 3. Porsen kadar logam Cu pada tumbuhan genjer

Berdasarkan Gambar 3, dapat diamati bahwa tumbuhan genjer konsisten dengan daya absorpsi logam Cu yang semakin hari semakin menurun. Kemampuan atau daya serap tertinggi tumbuhan dalam mengakumulasi logam Cu terjadi pada perlakuan t1 dimana daya serap tumbuhan mampu mencapai 55,781% dan yang paling rendah terjadi pada perlakuan t4 yakni 30,284%. Proses penyerapan logam berat oleh tumbuhan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan ideal dimana didalamnya terdapat iklim, kesuburan tanah, kesehatan tanaman, lamanya waktu perlakuan dan budidaya. Secara khusus iklim yang menentukan proses absorpsi oleh tanaman dikaitkan dengan sifat-sifat kelembaban (berkaitan dengan ketersediaan air, curah hujan), penyinaran matahari dan temperatur udara (Mohamad, E, 2011).

Selain itu tinggi rendah suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuh kembang tanaman, reproduksi dan juga kelangsungan hidup dari tanaman. Suhu apabila meningkat, absorpsi juga meningkat. Sebaliknya apabila suhu menurun, absorpsi menjadi lambat. Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa: "Semakin tinggi suhu lingkungan akan menyebabkan proses fotosintesis akan meningkat sehingga penyerapan tanaman terhadap air akan meningkat pula. Sebaliknya, jika suhu rendah maka daya absorbansinya juga lambat karena dengan suhu rendah otomatis kebutuhan tanah terhadap air akan berkurang, sementara logam berat diserap oleh tanaman bersamaan dengan air dan unsur hara" (dalam Mohamad, E, 2011).

Pada perlakuan t5, tumbuhan genjer mengalami hal yang tidak wajar terjadi karena tidak konsisten dalam tingkat penyerapannya. Dalam perlakuan ini tanaman sedikit mengalami peningkatan konsentrasi, suhu pada perlakuan ini diduga cenderung meningkat dibandingkan dengan perlakuan t4, sehingga menyebabkan daya absorbansi tanaman terhadap logam justru meningkat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Salisbury dan Ross.

Dengan demikian, meningkat atau tidak konsistennya jumlah kadar Cu pada perlakuan t5 tidak akan mempengaruhi efektifitas tumbuhan genjer dalam hal penyerapan logam berat Cu.

Karena pada dasarnya dalam penelitian ini telah dibuktikan bahwa tumbuhan genjer mampu menyerap atau mengakumulasi logam berat Cu dengan persentase kadar yang cukup tinggi dibandingkan dengan tumbuhan genjer pada perlakuan sebelum ditambahkan limbah buatan atau kontrol.

Pengaruh Waktu Kontak Tumbuhan Genjer Terhadap Adsorpsi Cu

Pengaruh waktu kontak tumbuhan genjer terhadap adsorpsi Cu dapat dilihat pada Gambar 4

Gambar 4. Pengaruh lama kontak tumbuhan terhadap adsorpsi Cu

Grafik dalam Gambar 4, memperlihatkan bahwa variasi waktu kontak tumbuhan (10, 15, 20, 25 dan 30 hari) mempengaruhi penyerapan ion logam Cu oleh tumbuhan genjer. Menurut Cheremisinof (1987) dan Khopkar (1990) (dalam Widaningrum, 2007) bahwa: "Waktu kontak antara ion logam dengan adsorben sangat mempengaruhi daya serap. Semakin lama waktu kontak maka penyerapan juga akan meningkat sampai pada waktu tertentu akan mencapai maksimum dan setelah itu akan turun kembali". Berdasarkan hasil analisa bahwa waktu kontak optimum diperoleh pada hari ke-10 dengan konsentrasi Cu yang teradsorpsi oleh tumbuhan genjer rata-rata sebesar 8,417 ppm. Setelah itu pada perlakuan t2 sampai t4 efisiensi adsorpsi Cu oleh tumbuhan mengalami penurunan diduga karena terjadi proses desorpsi. Hal ini merupakan salah satu fenomena dalam adsorpsi fisika yang menyatakan bahwa proses adsorpsi

bersifat reversibel (Sukardjo, 1987 dalam Leliana, 2010:127).

Berkaitan dengan proses desorpsi pada tumbuhan, Mohamad, E, (2011) menjelaskan bahwa "ketika tanaman mengalami desorpsi disebabkan oleh situs aktifnya telah mengalami desorpsi terhadap penyerapan ion logam dimana pada adsorpsi sudah mencapai kesetimbangan sehingga pada permukaan adsorben peluang untuk terdesorpsi ikatan antara Cu^{2+} dengan situs aktif menjadi lemah".

Pada perlakuan t5, jika dibandingkan dengan konsentrasi Cu pada perlakuan t1 dan t2, tanaman tetap mengalami desorpsi walaupun adsorpsi Cu pada perlakuan t5 ini sedikit mengalami kenaikan konsentrasi dari perlakuan t3 dan t4. Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor desorpsi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mohamad, E.

Dari hasil uji statistik menggunakan uji F dengan tingkat kesalahan 5% (lampiran 6) pada tumbuhan genjer diperoleh F hitung 8,06 > F tabel 3,48. Dimana jika F hitung > F tabel pada taraf nyata 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. H_0 atau hipotesis yang menunjukkan bahwa antara perlakuan lama kontak yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki perbedaan melainkan sama antara satu perlakuannya. Sebaliknya H_1 adalah hipotesis yang menunjukkan dalam setiap perlakuan memiliki keragaman atau ada perbedaan antara perlakuan yang satu dengan yang lainnya. Dengan diterimanya H_0 maka ini menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata dalam setiap perlakuan terhadap Cu teradsorpsi pada tumbuhan genjer. Untuk mengetahui perlakuan mana yang pengaruhnya berbeda nyata dilakukan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%.

Dari hasil uji statistik menggunakan uji BNT pada taraf nyata 0,05 diperoleh pada perlakuan hari ke-10 dengan hari ke-20, 25 dan ke-30 memiliki pengaruh nyata terhadap Cu teradsorpsi pada tumbuhan, selanjutnya pada perlakuan hari ke-15 dengan perlakuan hari ke-20 dan ke-25 pengaruhnya juga berbeda nyata dalam hal penyerapan Cu oleh tumbuhan. Walaupun dari semua perlakuan yang ditetapkan ada perlakuan tertentu yang pengaruhnya tidak berbeda nyata, hal tersebut tidak akan

mengubah hal ini dalam setiap perlakuan dengan yang lain keragaman. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki adsorpsi yang berbeda dengan perlakuan

Kesimpulan

1. Tumbuhan genjer dapat dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat Cu pada tanah tercemar.
2. Proses adsorpsi Cu oleh tumbuhan genjer terpengaruh oleh konsentrasi Cu dalam larutan (ppm). Dengan variasi waktu kontak, konsentrasi Cu oleh tumbuhan genjer terpengaruh oleh waktu kontak.
3. Melalui uji statistik F dan uji BNT atau uji beda nyata terkecil (BNT) Cu(II) teradsorpsi oleh tumbuhan genjer berbeda nyata.

Saran

penelitian ini perlu dilanjutkan terhadap pengaruh faktor-faktor lain yang menyebabkan perbedaan hasil.

Daftar Pustaka

Aiyen, D.

Anshori,

Antari,

mengubah hipotesis yang telah membuktikan bahwa dalam setiap perlakuan lama kontak yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan atau keragaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuhan genjer pada hari ke-10 (t1) memiliki absorpsi Cu(II) yang baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya yakni sebesar 8,417 ppm.

Kesimpulan

1. Tumbuhan genjer (*limnocharis flava*) dapat dimanfaatkan sebagai agen fitoremediator karena dapat menyerap dan mengakumulasi logam Cu pada tanah tercemar.
2. Proses absorpsi Cu tertinggi oleh tumbuhan genjer terjadi pada hari ke-10 yakni sebesar 8,417 ppm. Dan ternyata semakin lama perlakuan atau waktu kontak semakin sedikit absorpsi logam Cu oleh tumbuhan genjer.
3. Melalui uji statistik pada taraf 5%, lama kontak atau perlakuan memiliki pengaruh nyata terhadap Cu(II) terabsorpsi pada tumbuhan genjer.

Saran

perlu dilakukan studi ataupun penelitian lebih lanjut terhadap hal-hal yang mempengaruhi proses penyerapan logam berat oleh tumbuhan, seperti faktor eksternal ataupun faktor lain yang dapat menyebabkan tanaman mengalami deaktivasi.

Daftar Pustaka

- Aiyen, Dr, Sc, Agr. 2005. Ilmu Fitoremediasi Untuk Atasi Pencemaran Tanah di Aceh dan Sumatera Utara (Tambahan Catatan Untuk Prof. Dr. Azwar Ma As). Kompas, 4 Maret 2005. <http://www.kompas.com/kompascetak/0503/041/ilpeng/1592821.htm>.
- Anshori, Al., Jamaludin, S.Si. 2005. Spektrometri Serapan Atom. Materi Ajar. Staf Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Lingkungan. Jurusan Kimia FMIPA. Universitas Padjadjaran. Bandung
- Antari, A.A.R.J., Ketut, I. S. 2002. Kandungan Timah Hitam (Plumbum) pada tanaman

peneduh jalan di kota Denpasar. Jurusan Biologi. F.MIPA-UNUD

- Day, R, A & A, L., Underwood. 2002. Analisis Kimia Kuantitatif. Erlangng. Jakarta
- Hardiani, H. 2009. Potensi Tanaman Dalam Mengakumulasi Logam Cu Pada Media Tanah Terkontaminasi Limbah Padat Industri kertas. *BS, Vol. 44, No. 1, Juni 2009* : 27-40
- Hardyanti. 2007. *Fitoremediasi Phospat Dengan Pemanfaatan Enceng Gondok (Eichhornia Crassipes) (Studi Kasus Pada Limbah Cair Industri Kecil Laundry)*. <http://eprints.undip.ac.id>. 16 februari 2014 (15:40)
- Haruna, T, Elvira. 2012. Fitoremediasi pada media tanah yang mengandung Cu dengan menggunakan kangkung darat. Skripsi. Pendidikan Kimia. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Haryati, M., Purnomo, T., Kuntjoro, S. 2012. Kemampuan Tanaman Genjer (*Limnocharis Flava* (L.)Buch.) Menyerap Logam Berat Timbal (Pb) Limbah Cair Kertas pada Biomassa dan Waktu Pemaparan Yang Berbeda. *LenteraBio Vol. 1 No. 3 September 2012*:131-138
- Khopkar, SM. 1985. *Basic Concepts of Analytical Chemistry*. Wiley Eastern Limited. Terjemahan A. Saptorahardjo. 1990. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Cetakan pertama. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta
- Kristianingrum, S. 2012. Kajian Berbagai Proses Destruksi Sampel Dan Efeknya. Makalah-Semnasa MIPA. FMIPA UNY. Yogyakarta
- Lakitan, B. 2004. *Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Lelifajri. 2010. Adsorpsi Ion Logam Cu(II) Menggunakan Lignin dari Limbah Serbuk Kayu Gergaji. *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan Vol. 7, No. 3, hal. 126-129, 2010 ISSN 1412-5064*. Jurusan

- Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh Darussalam
- Mangkoedihardjo, S. 2005. Fitoteknologi dan Ektoteknologi dalam Desain Operasi Pengomposan Sampah. *Seminar Nasional Teknologi Lingkungan III ITS. Online.* <http://www.its.ac.id/personal/files/pub/170-sarwokoenviroseminar%20sampah%20T.L.pdf>. 16 Februari 2014 (9:00)
- Mohamad, E. 2011. Fitoremediasi Logam Berat Kadmium (Cd) Dalam Tanah Dengan Menggunakan Bayam Duri (*Amaranthus spinosus L.*). Tesis. Program studi ilmu kimia—minat kimia lingkungan. Universitas Brawijaya. Malang
- Nisma, F. 2008. Seleksi Beberapa Tumbuhan Air Sebagai Penyerap Logam Berat Cd, Pb Dan Cu Di Kolam Buatan Fmipa Uhamka. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas muhammadiyah prof.dr. Hamka. Jakarta
- Nurhayati, N. 2013. *Pencemaran Lingkungan*. Yrama Widya. Bandung
- Palar, H. 2012. *Pencemaran dan toksikologi logam berat*. Rineka cipta. Jakarta
- Panjaitan Yanti Grace. 2009. *Akumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) dan Timbal (Pb) Pada Pohon *Avecennia marina*-di hutan mangrov.* Skripsi USU. <http://repository.usu.ac.id>. 16 februari 2014 (16:00)
- Pitriana. 2012. Biologi tumbuhan lahan basah. *Online.* <http://biologitumbuhanlahanbasah.blogspot.com/2012/11/genjer-limnocharis-flava.html>. 25 april 2014 (16:30)
- Prihatiningsih, K.W. 2007. Penetapan Kadar Tembaga (Cu) Pada Sampel Air Dengan Metode Spektrofotometri. Laboratorium PDAM Tirtanadi . Medan.
- Priyanti, Ety, Y. 2013. Uji Kemampuan Serap Tumbuhan Genjer (*Limnocharis flava*) Terhadap Logam Berat Beracun dan Mangan (Mn). UIN Sunan Hidayatullah. Jakarta
- Rachma, N, A., Rachmadiarti, F., Kuntjoro, S. 2014. Kemampuan Adaptasi Tumbuhan Terhadap Logam Berat Kadmium (Cd) dan Logam Berat Tembaga (Cu) pada Tumbuhan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Unesa Surabaya. Surabaya. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/erabio>. 12 Juli 2014 (22:00)
- Santriyana D., Hayati R M., Apriani I. 2011. *Eksplorasi Tumbuhan Fitoremediasi Aluminium (Al) Yang Ditambang Pada Limbah Ipa Pdam Kota Khatulistiwa Kota Pontianak.* Program Studi Ilmu Tanah, Universitas Tanjungpura
- Schnoor, J.L and McCutcheon, S.C. 2005. *PHYTOREMEDIATION: A Practical Approach to the Control of Contaminants*. Wiley-Interscience Inc, USA.
- Supriyanto, C., Samin, Zainul, K. 2007. *Analisis Pencemaran Logam Berat Pb, Cu, dan Zn Pada Ikan Air Tawar Dengan Metode Spektrometri Nyala Serapan Atom (SSA).* Seminar Nasional Ilmiah Teknologi Nuklir Yogyakarta, 2007 november issn 1978-0176. Yogyakarta
- Widaningrum., Miskiyah dan Suisman. 2007. *Bahaya Kontaminasi Logam Berat Dalam Sayuran Dan Alternatif Pencegahan Cemarannya.* Balai Teknologi Pascapanen Pertanian. 2007
- Yitnosumarto, S. 1993. *Percobaan Penetapan Analisis, Dan Interpretasi.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

ISSN 1907-1965

9 771907 196578